

# Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.**

**Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, müssen Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.**

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

## **Diese Packungsbeilage beinhaltet:**

1. Was sind Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen und wofür werden sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen beachten?
3. Wie sind Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie sind Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

## **1. Was sind Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen und wofür werden sie angewendet?**

Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen sind ein homöopathisches Arzneimittel bei Erkrankungen des Mund- und Rachenraumes.

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab.

Dazu gehören: **Halsschmerzen.**

Bei pochenden Schmerzen, Lymphdrüsenanschwellungen und Fieber über 39 ° C sowie bei länger anhaltenden Beschwerden ist ein Arzt aufzusuchen, da es sich um Erkrankungen handeln kann, die einer ärztlichen Abklärung bedürfen.

## **2. Was müssen Sie vor der Einnahme von Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen beachten?**

### **Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen dürfen nicht eingenommen werden**

- in Schwangerschaft und Stillzeit und bei bekannter Bromüberempfindlichkeit.
- bei Überempfindlichkeit gegen einen der Wirk- oder Hilfsstoffe (Echinacea, Brom) oder gegen Korbblütler.
- aus grundsätzlichen Erwägungen bei fortschreitenden Systemerkrankungen wie Tuberkulose, Leukämie bzw. Leukämie-ähnlichen Erkrankungen, entzündlichen Erkrankungen des Bindegewebes (Kollagenosen), Autoimmunerkrankungen, multipler Sklerose, AIDS-Erkrankung, HIV-Infektion oder anderen chronischen Viruserkrankungen.
- bei Schilddrüsenerkrankungen (nicht ohne ärztlichen Rat).

## **Besondere Vorsicht bei der Einnahme von Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen ist erforderlich**

bei Kindern unter 12 Jahren, da hier zur Anwendung dieses Arzneimittels keine ausreichend dokumentierten Erfahrungen vorliegen. Es soll deshalb von Kindern unter 12 Jahren nicht eingenommen werden.

## **Bei Einnahme von Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen mit anderen Arzneimitteln:**

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln oder anderen Mitteln sind bisher nicht bekannt.

Allgemeiner Hinweis: Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden. Falls Sie sonstige Arzneimittel anwenden, fragen Sie Ihren Arzt.

## **Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:**

Auswirkungen von Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen auf die Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen sind bisher nicht bekannt.

## **Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen:**

Dieses Arzneimittel enthält Lactose (Milchzucker). Bitte nehmen Sie Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen daher erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

Hinweis für Diabetiker: 1 Tablette enthält ca. 0,04 Broteinheiten (BE)

## **3. Wie sind Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen einzunehmen?**

Nehmen Sie Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage ein. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis:

Bei akuten Zuständen alle halbe bis ganze Stunde, höchstens 6-mal täglich, je 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Eine über eine Woche hinausgehende Anwendung sollte nur nach Rücksprache mit einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten erfolgen.

Bei chronischen Verlaufsformen 1- bis 3-mal täglich je 1 Tablette im Mund zergehen lassen. Bei Besserung der Beschwerden ist die Häufigkeit der Anwendung zu reduzieren.

Nehmen Sie Müller'sche Tabletten bei Halsschmerzen ohne ärztlichen Rat nicht länger als acht Wochen ein.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Ihrem Apotheker oder einem homöopathisch erfahrenen Therapeuten, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen zu stark oder zu schwach ist.

### **Wenn Sie eine größere Menge Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen eingenommen haben, als Sie sollten**

kann es bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz) zu Magen-Darm-Beschwerden kommen oder es kann eine abführende Wirkung auftreten. Die unter 4. beschriebenen Nebenwirkungen können verstärkt auftreten.

### **Wenn Sie die Einnahme von Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen vergessen haben**

holen Sie diese bitte nach, sobald Sie es bemerken. Nehmen Sie aber nicht die doppelte Dosis ein.

### **Wenn Sie die Einnahme von Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen abbrechen**

können sich Ihre Beschwerden wieder verschlimmern oder erneut auftreten.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder einen homöopathisch erfahrenen Therapeuten.

## **4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?**

Wie alle Arzneimittel können Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandelte von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandelte von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandelte von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

### **Mögliche Nebenwirkungen:**

Nach Anwendung von Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen kann verstärkt Speichelfluss auftreten, das Mittel ist dann abzusetzen.

Wegen des Bestandteils Mercurius (Quecksilber) können gelegentlich allergische Reaktionen auftreten. In Einzelfällen können Überempfindlichkeitsreaktionen auftreten. Für Arzneimittel mit Zubereitungen aus Sonnenhut (Echinacea) wurden Hautausschlag, Juckreiz, selten Gesichtsschwellung, Atemnot, Schwindel und Blutdruckabfall beobachtet. In diesen Fällen sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt aufsuchen.

Aufgrund des enthaltenen Milchzuckers kann es, insbesondere bei Personen mit Milchzuckerunverträglichkeit (Lactoseintoleranz), häufig zu leichten Magen-Darm-Beschwerden (Übelkeit, Blähungen, Durchfall) kommen (siehe hierzu auch unter 2. „Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen“).

Hinweise: Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

## **5. Wie sind Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen aufzubewahren?**

Arzneimittel sind für Kinder unzugänglich aufzubewahren!

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Runddose und der Faltschachtel nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch: 3 Monate

### **Aufbewahrungsbedingungen:**

Nicht über 25°C aufbewahren!

In der Originalpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Feuchtigkeit/Licht zu schützen.

## **6. Weitere Informationen**

### **Was Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen enthalten:**

Die Wirkstoffe sind:

1 Tablette enthält:

Ammonium bromatum Trit. D3	8,0 mg
Belladonna Trit. D4	325,0 mg
Calcium jodatum Trit. D4	4,5 mg
Echinacea Trit. D2	23,0 mg
Mentholum Trit. D2 [HAB, V. 5a, Lsg. D1 mit Ethanol 62% (m/m)]	1,5 mg
Mercurius cyanatus Trit. D12	80,0 mg

Die sonstigen Bestandteile sind: Lactose-Monohydrat (Milchzucker), Magnesiumstearat [pflanzlich].

### **Wie Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen aussehen und Inhalt der Packungen:**

Müller'sche Tabletten® bei Halsschmerzen sind abgefüllt in Runddosen mit Faltenbalgstopfen und in Originalpackungen mit 40 Tabletten erhältlich.

### **Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller**

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik Göppingen, Carl Müller, Apotheker, GmbH u. Co. KG  
73033 Göppingen, Bahnhofstraße 33 - 35 + 40, 73008 Göppingen, Postfach 869  
Telefon: 0 71 61 / 676 - 0, Telefax: 0 71 61 / 676 - 298  
E-Mail: info@mueller-goepingen.de

**Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2008.**